



MECOLZINE®
Mesalazina 500 mg
comprimidos gastroresistentes



MECOLZINE®
Mesalazina 500 mg
supositorios

CU: Colitis Ulcerosa



Dosificación



**Formulación galénica
pH dependiente**



**La mejor relación
precio/calidad**



**Tratamiento de
la CU aguda**



**Tratamiento de
mantenimiento de la CU**



**La mejor relación
precio/calidad**




MECOLZINE®

Mesalazina 500 mg

comprimidos gastrorresistentes



- Alta eficacia clínica (tratamiento agudo y de mantenimiento de la CU)¹⁻⁴
- Comprimidos pH dependientes⁴
- Liberación en el momento y lugar adecuado, garantizando su seguridad^{1,4}
- Libres de gluten y lactosa, lo que representa un menor riesgo de alergias y eventos adversos⁵





Dosificación



Para una correcta posología, tener en cuenta:

- **Gravedad de la CU** (leve, moderada o severa)¹
- **Extensión anatómica de la CU** (proctitis hasta pancolitis)¹

**CU aguda,
leve a moderada²⁻⁴:**

2,0 a 4,8 g/día
(4 a 9 comprimidos
aproximadamente)

**Mantenimiento
de remisión²⁻⁴:**

2,0 a 3,0 g/día
(4 a 6 comprimidos)

Las dosis totales/día
deben ser divididas
en 2 a 3 tomas diarias¹

Mantener
concentraciones activas
del medicamento

Alta eficacia

**El éxito del tratamiento depende de la dosis correcta,
vía de administración y adherencia al tratamiento^{1,5}**






Formulación galénica pH dependiente



- **Mecolzine®** está recubierto por **Eudragit®**, una capa fina de resina acrílica que lo protege de su liberación temprana e inadecuada¹
- Este **recubrimiento** está hecho con una **mezcla** de Eudragit® **L y S** cuya liberación ocurre en el rango de pH 6-7, presente en las mucosas del **íleon** y del colon¹
- El recubrimiento de Mecolzine® lo hace **gastroresistente**, asegurando su **liberación en el lugar adecuado y la cantidad suficiente**, aumentando su eficacia clínica ¹



Mesalazina en presentación de **comprimidos sin recubrimiento** es absorbida en el estómago y en el intestino delgado alto, **limitando su disponibilidad** en el íleon terminal y en el colon¹



MECOLZINE®

Mesalazina 500 mg

supositorios



- Eficaz en la remisión de la CU leve a moderada y de la proctitis¹⁻⁴
- Previene las recaídas en la proctitis ulcerosa⁴
- Seguridad clínica comprobada durante el embarazo*⁴




1era línea de manejo de la CU activa de leve a moderada¹⁻⁵





Tratamiento de la CU aguda





Tratamiento de mantenimiento de la CU

